




COVID – 19

zapobieganie infekcji w gabinecie stomatologicznym

1. Ocena stanu zdrowia pacjenta



- Wywiad dotyczący potencjalnego narażenia na kontakt z COVID-19 [tak/nie, wysokie/niskie ryzyko]
- Pomiar temperatury ciała przy pomocy bezkontaktowego termometru

2. Zakwalifikowanie pacjenta do leczenia

Małe ryzyko ekspozycji
T < 37,3 °C
 Wdrożenie leczenia ze specjalnymi środkami ochrony. Unikaj generowania aerozolu

Duże ryzyko ekspozycji
T < 37,3 °C
 Wskazana kwarantanna 14 dni

Małe ryzyko ekspozycji
T > 37,3 °C
 Wskazanie do leczenia szpitalnego

Duże ryzyko ekspozycji
T > 37,3 °C
 Konieczna kwarantanna oraz wskazanie do leczenia szpitalnego

3. Leczenie pacjenta

Leczenie w trybie pilnym (trepanacja zęba, nacięcie ropnia, ekstrakcja zęba będącego przyczyną ropnia, zaopatrzenie pacjentów urazowych)

Leczenia w trybie przyspieszonym (np. usunięcie torbieli, usunięcie zęba z bólem, zaopatrzenie doraźna zachowawcze, endodontyczne)

Wskazane odroczenie: Leczenie w trybie planowym (ekstrakcje ze wsk. orto; leczenie implantologiczne, protetyczne, ortodontyczne)

Mycie rąk

Środki Ochrony Osobistej

Płukanie jamy ustnej

Koferdam

Narzędzia ręczne i wysoka siła ssania

Częste dezynfekowanie

RTG

WHO zaleca mycie rąk zgodnie z zasadą dwa-przed-i-trzy-po

Przed użyciem środków dezynfekcyjnych

Po: kontakcie z pacjentem, narażeniu na aerozol, leczeniu

Stosuj jednorazowe czepki na włosy, maska chirurgiczna (rekomendowane w filtrem HEPA), rękawiczki, fartuchy chirurgiczne. Używaj przyłbicy lub gogli.

Usunie drobnoustroje obecne w jamie ustnej. Rekomendowane stosowanie 1 % nadtlenu wodoru lub 0,2% Povidine

Zredukuje rozpylanie aerozolu

Narzędzia ręczne redukują ilość generowanego aerozolu

Dezynfekuj wszystkie miejsca do dostępne pacjentom, poza gabinetem również poczekalnie i rejestrację. Pamiętaj o wietrzeniu pomieszczeń

Rekomendowane RTG pantomograficzne i/lub CBCT